

地。

60. 柱果铁线莲(中国高等植物图鉴) 小叶光板力刚、花木通、猪娘藤(浙江), 钩铁线莲、癞子藤(云南药用植物名录)


*Clematis uncinata* Champ. in Kew Journ. Bot. 3: 255. 1851; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 523. 1903, p. p.; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1: 327. 1913, p. p.; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 106. 1927, excl. syn.; Péi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 10: 108. 1936, et in Sunyatsenia 4: 162. 1940, excl. syn. *C. leiocarpa* Oliv.; W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 373. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 747, 图 1493. 1972.——*C. recta* L. ssp. *chinensis* 4. *uncinata* (Champ.) Kuntze in Verh. Bot. Ver. Brand. 26: 115. 1885.——*C. drakeana* Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. 11: 168. 1902.——*C. gagnepainiana* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 219. 1904.——*C. uncinata* var. *floribunda* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30: 18. 1911, et Icon. pl. Formos. 7: 20. 1911; 台湾植物志 2: 493. 1976.——*C. floribunda* (Hay.) Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric. 4: 188. 1932.——*C. uncinata* var. *bitermata* W. T. Wang, l. c. 374.

藤本,干时常带黑色,除花柱有羽状毛及萼片外面边缘有短柔毛外,其余光滑。茎圆柱形,有纵条纹。一至二回羽状复叶,有5—15小叶,基部二对常为2—3小叶,茎基部为单叶或三出叶;小叶片纸质或薄革质,宽卵形、卵形、长圆状卵形至卵状披针形,长3—13厘米,宽1.5—7厘米,顶端渐尖至锐尖,偶有微凹,基部圆形或宽楔形,有时浅心形或截形,全缘,上面亮绿,下面灰绿色,两面网脉突出。圆锥状聚伞花序腋生或顶生,多花;萼片4,开展,白色,干时变褐色至黑色,线状披针形至倒披针形,长1—1.5厘米;雄蕊无毛。瘦果圆柱状钻形,干后变黑,长5—8毫米,宿存花柱长1—2厘米。花期6月至7月,果期7月至9月。

在我国分布于云南东南部(海拔300—1700米),贵州(600—1300米)、四川(600—1800米)、甘肃南部、陕西南部、广西(250—1100米)、广东(200—1000米)、湖南(100—1050米)、福建、台湾(1500—2000米)、江西、安徽南部(200—1000米)、浙江(100—1000米)、江苏宜兴(200米左右)。生山地、山谷、溪边的灌丛中或林边,或石灰岩灌丛中。越南也有分布。模式标本采自香港。

根入药,能祛风除湿、舒筋活络、镇痛,治风湿性关节炎痛、牙痛、骨鲠喉;叶外用治外伤出血(全国中草药汇编)。

根据文献记载,与本种较接近的尚有二种,*C. trichocarpa* Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 16(3): 79. 1956及*C. alsomitriifolia* Hay. Ic. Pl. Formos. 3:1. 1913,二者子房、瘦果有毛,均产我国台湾,因未见标本,留待进一步考订。

舟柄铁线莲 *Clematis dilatata*

1. 部分茎示花序、叶、叶柄；2. 萼片(外面和内面)；3. 心皮；4. 瘦果；5. 雄蕊(外面和内面)。 (史渭清绘)